

Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19

KARANTÉNA

Klinické příznaky onemocnění COVID-19:

- teplota $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$
- suchý kašel
- dušnost
- zažívací obtíže
- ztráta chuti a čichu

pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak

Asymptomatický kontakt

Nařízení karantény a provedení PCR testu 4. - 5. den od kontaktu*



Symptomatický kontakt

Nařízení karantény a provedení PCR testu 1. - 5. den od kontaktu



Nařízení **izolace** na min. 10 dní od odběru prvního pozitivního PCR testu



Nařízení **PCR testu** 10. den od rizikového kontaktu

Nařízení **izolace** na min. 10 dní od odběru prvního pozitivního PCR testu



Ukončení izolace nejdříve 10. den od odběru prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně poslední 3 dny je pacient bez klinických příznaků. PCR se již neprovádí.#

Pacient je považován za neinfekčního

#neplatí pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách

Ukončení karantény
Pacient je považován za neinfekčního

**pokud se nepodaří PCR test do 5. dne provést, provede se pouze jeden test, 10. den od rizikového kontaktu – platí pouze pro asymptomatický kontakt*

Ukončení izolace nejdříve 10. den od odběru prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně poslední 3 dny je pacient bez klinických příznaků. PCR se již neprovádí.#

Pacient je považován za neinfekčního

#neplatí pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



CENTRÁLNÍ
ŘÍDÍCÍ TÝM
COVID-19