



Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Informace o povinném očkování dětí proti tuberkulóze (TBC)

Vážený rodiče,

u Vašeho dítěte bylo dle dostupných údajů zjištěno vyšší riziko vzniku tuberkulózy (TBC). Toto onemocnění znamená zvláště pro nejmenší děti velmi závažné zdravotní ohrožení. Očkování proti TBC významně snižuje možnost vzniku tohoto onemocnění, a to především nejzávažnějších forem. U Vašeho dítěte je očkování plně indikováno podle právních předpisů, a to v co nejkratší době po narození. Výhodou brzké vakcinace proti TBC je co nejdříve navození imunity proti této nemoci a žádný nebo minimální posun dalších očkování. Další očkování lze totiž aplikovat až po zhojení reakce po TBC očkování.

Při očkování proti TBC se užívá živé oslabené vakcíny, která se podává do kůže na levé paži. Po očkování se po 6-8 týdnech obvykle objeví uzlík nebo vřídek do 10 mm v průměru v místě očkování, může se také zvětšit uzlinka v levém podpaží nebo vlevo na krku do velikosti 10 mm. V ojedinělých případech se mohou objevit větší reakce než 10 mm a zhnisání místa očkování nebo uzlin. Očkování bývá zcela výjimečně provázeno i závažnějšími reakcemi, jako je možný vývoj kostní infekce či rozsev oslabeného vakcinačního kmene v organismu dítěte u dětí se závažnou poruchou obranyschopnosti. Ani podrobným vyšetřením není možné časně po porodu předpovědět reakci po očkování. Přínos očkování však převažuje nad rizikem případných komplikací. Vaše dítě bude navíc stále pod dohledem dětského lékaře a bude kontrolováno i na kalmetizačním pracovišti, kde proběhlo očkování. Případné nežádoucí reakce na očkovací látku, které by se vymykaly běžné místní reakci, co nejdříve konzultujte s těmito odborníky.

Byl jsem seznámen s nutností provedení vakcinace proti TBC u mého dítěte a s jeho přínosy a riziky.

Jméno a rodné číslo dítěte

Dne

.....
podpis rodiče