



# *Jak se připravit na chřipkovou sezónu?*




## Chřipka

je relativně závažná infekce, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel. Souvisí s ní v průměru více než 1000 úmrtí ročně.

## Zdroj

člověk infikovaný  
virem chřipky



## Inkubační doba

obvykle trvá **1–4 dny**

## Přenos



vzduchem,  
kapénkami



prostřednictvím  
kontaminovaných  
rukou a předmětů

## Období nakažlivosti



- u dospělých  
**1.–5. den onemocnění**



- u dětí a osob se sníženou  
obranyschopností  
**je doba delší**

## Příznaky

náhlý  
začátek



suchý  
dráždivý  
kašel



bolest  
hlavy



bolest  
v krku



bolest  
kloubů



bolest  
svalů



zvýšená  
teplota,  
horečka



celková  
únava



slabost,  
vyčerpanost



## Trvání nemoci



U nekomplikovaných případů  
**4–7 dní**

U starších, oslabených,  
chronicky nemocných osob



**se chřipka často komplikuje zánětem plic nebo zánětem srdečního svalu,**  
které mohou ohrožovat život pacienta.



U dětí se může jako komplikace chřipky vyskytnout

- **zánět středního ucha,**
- **zánět vedlejších dutin nosních.**



**Léčba** je zaměřená na zmírnění příznaků onemocnění (léky na zmírnění bolesti hlavy, svalů, kloubů a snižování horečky).



U pacientů z rizikových skupin lze na základě individuálního posouzení lékaře zahájit léčbu **antivirotiky**.



**Antibiotika** nejsou určena k léčbě chřipky. (Teprve v případech vzniku druhotné bakteriální infekce jsou předepsána antibiotika.)



**Důležitý je dostatečný příjem tekutin a klid na lůžku.**


## **Jak omezit šíření chřipky u vás doma?**

**Pokud jste nemocný...**

omezte kontakty  
s ostatními  
členy domácnosti



a je-li to  
možné,  
izolujte se




při nutném  
kontaktu  
s rodinou  
používejte roušku



používejte  
jednorázové  
kapesníky  
a vyhazujte  
je do koše

častěji  
si myjte  
ruce  
vodou  
a mýdlem



častěji větrejte

pravidelně čistěte povrchy,  
kterých se dotýkáte




## **Opatření snižující riziko šíření viru chřipky**

očkování



odstup



rouška nebo respirátor



zodpovědné  
chování



mytí rukou  
vodou a mýdlem



# OČKOVÁNÍ

*je nejlepší ochrana proti chřipce:*

- pomáhá snižovat procento komplikací,
- pomáhá snižovat počty nemocných i zemřelých.

*Kdy se nechat očkovat?*



Na podzim před začátkem chřipkové sezóny, ideálně od října do listopadu.

Ochrana nastupuje přibližně za dva týdny po podání vakcíny.

*Očkování se doporučuje* jako prevence chřipky u dospělých, u dětí ve věku od 6 měsíců a mladistvých. **Zejména:**



- osobám starším 65 let



- těhotným ženám (v jakékoli fázi těhotenství)



- ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny



- osobám jakéhokoli věku (včetně dětí) s chronickým onemocněním



- osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin

*Případné vedlejší účinky vakcíny jsou obvykle mírné*

K běžným vedlejším účinkům očkování proti chřipce patří:

bolestivost a zarudnutí v místě vpichu



Někdy se mohou vyskytnout:



bolesti hlavy



bolesti svalů



únavu



pocit na zvracení



zvýšená teplota

Tyto vedlejší účinky jsou na rozdíl od chřipky mírné a rychle ustupují.

*Jak se chovat  
3 dny  
po očkování*

Dbejte rady  
lékaře



Pijte alespoň  
2 litry tekutin denně  
(dospělí)




Dodržujte  
klidový režim



V případě  
teploty užíjte lék na  
její snížení



Na bolestivé a zarudlé  
místo vpichu přiložte  
studený obklad




Omezte  
fyzickou námahu  
a návštěvu posilovny



Nepijte alkohol




Nevystavujte se  
slunečnímu záření



Nevystavujte se  
solárnímu záření



Nenavštěvujte saunu





Nechod'te na masáže,  
lymfodrenáže



## *Očkování proti chřipce jako služba hrazená zdravotními pojišťovnami je poskytováno osobám:*

- nad 65 let věku;
- které trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, onemocněním dýchacích cest, ledvin nebo diabetem;
- po splenektomii (chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna slezina);
- po transplantaci krvetvorných buněk;
- umístěných
  - ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče,
  - v domovech pro seniory,
  - v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
  - v domovech se zvláštním režimem;
- se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti;
- po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci;
- pracujících ve zdravotnictví (zdravotníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví).



## *Informujte se:*

- u svého lékaře, zda máte nárok na očkování zdarma nebo na příspěvek,
- u svého zaměstnavatele, zda vám očkování hradí nebo na něj přispívá,
- u své pojišťovny, zda máte nárok na očkování zdarma nebo na příspěvek.

## *Každoroční očkování je nutné z důvodu:*



- poklesu hladiny ochranných protilátek,
- průběžně probíhající změny cirkulujících kmenů chřipky.

## *Čekáte miminko?*

### *Očkujte se proti chřipce*



- U těhotných žen je větší riziko závažného průběhu nemoci.
- Riziko závažné infekce v těhotenství zvyšují přidružené nemoci (např. astma, cukrovka, obezita, infekce HIV).
- Onemocnění chřipkou může způsobit závažné poškození plodu.

## *Očkování proti chřipce je nejlepší ochranou pro vás a vaše dítě*

- Očkování zabraňuje infekci u těhotných žen i u jejich potomků prostřednictvím přenosu protilátek matky.
- Očkování matky tak novorozence chrání během jeho prvních měsíců života v době, kdy je ještě příliš malý (do 6 měsíců), aby byl očkován.

Novorozené děti nemají plně vyvinutý imunitní systém, proto mají sníženou schopnost bojovat s infekcemi a chřipka pro ně znamená vážné ohrožení zdraví.



## *Očkování proti chřipce je bezpečné pro těhotné i kojící ženy*

- Doporučuje se těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny.
- Po aplikaci milionů dávek vakcín proti chřipce těhotným ženám se vakcína v těhotenství osvědčila jako bezpečná a účinná.



**OBJEDNEJTE SE U SVÉHO LÉKAŘE A NECHTE SE NAOČKOVAT PROTI CHŘIPCE.**

# MÝTY o očkování

Očkování není bezpečné, způsobuje mnoho nežádoucích účinků a dokonce úmrtí.

➤ Nebezpečné jsou nemoci, proti kterým očkování chrání. Zdravotní efekt očkování je příznivější než u naprosté většiny jiných lékařských výkonů nebo zákroků.

Bezpečnost vakcín je prokazována v rámci velmi přísného hodnocení. Vše probíhá pod přísnou kontrolou odborníků.

Nejlepší je nemoc prodělat, je to lepší než očkování.

➤ Očkování je menší zátěž než nemoc. Obecně se očkování doporučuje proti nemocem, které mohou probíhat s komplikacemi. Po onemocnění mohou přetrvávat trvalé následky nebo může dojít k úmrtí.

Očkování vyvolává astma či alergie.

➤ Neexistují vědecké důkazy o tom, že by očkování způsobovalo nebo zhoršovalo alergie. Naopak pro řadu lidí s astmatem nebo atopickým ekzémem je očkování doporučováno, protože pacienti mohou mít vyšší riziko nákazy a těžkého průběhu onemocnění.

Nežádoucí účinky očkování jsou bagatelizovány a nejsou hlášeny.

➤ Všichni zdravotníci jsou povinni hlásit veškeré závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování. Hlásit podezření na nežádoucí účinky může navíc kdokoliv včetně očkovaného nebo jeho příbuzného:

<https://nezadouciciucinky.sukl.cz/>. Hlášení shromažďuje a vyhodnocuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. O výsledcích následně informuje veřejnost.

Očkovací látky obsahují toxické látky, např. hliník nebo rtuť.

➤ Koncentrace těchto přídatných látek je ve vakcínách minimální a bezpečná. Mnohem vyšší příjem toxických látek „dostáváme“ z životního prostředí. Žádné vakcíny používané v ČR rtuť neobsahují.

Některé očkovací látky mohou vyvolat nemoc, proti které mají chránit.

➤ Očkování mohou někdy doprovázet vedlejší účinky, které jsou reakcí organismu, mohou být i podobné jako příznaky dané nemoci, ale rychle ustupují. Očkování nemůže způsobit nemoc, proti které se očkuje.

Očkování oslabuje imunitní systém a naši obranyschopnost.

➤ Očkování nezatíží imunitní systém nad jeho míru, protože jeho kapacita je mnohonásobně vyšší. Vakcinace proto neoslabuje imunitní systém. U dětí dokonce překlenuje období imunitní nevyzrálosti. Očkování imunitní systém posiluje a chrání nás před onemocněním, případně před závažným průběhem nemoci.